

XXX.—Descriptions of Chalcidites discovered in the Isle of Chonos by C. Darwin, Esq. By FRANCIS WALKER, Esq., F.L.S.

Lamprotatus Numitus, Mas. Niger, abdomen æneum, antennæ nigræ, pedes fulvi, femora nigra, alæ sublimpidæ.

Corpus breve, convexum, nigrum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, graciles, filiformes, thorace non longiores ; articulus 1^{us} longus, gracilis ; 2^{us} longicyathiformis ; 3^{us} et 4^{us} minimi ; 5^{us} et sequentes breves, usque ad 10^{um} paullo curtantes : thorax longi-ovatus : prothorax transversus, brevis, antice angustus : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatae, postice approximatæ ; paraptera et epimera magna ; scutellum subconicum : metathorax brevis, declivis, postice angustus : petiolus brevis : abdomen æneum, brevi-ovatum, nitens, læve, glabrum, thorace multo brevius ; segmentum 1^{um} magnum ; 2^{um} et sequentia brevissima : pedes fulvi, simplices, subæquales ; coxae nigræ ; femora nigra, apice fulva ; tarsi apice fusi : alæ sublimpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fusi ; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari non brevior, cubitali multo longior ; stigma mediocre. (Corp. long. lin. 1 $\frac{1}{3}$; alar. lin. 2 $\frac{1}{4}$.)

Pteromalus? Oxyntes, Fem. Ater, antennæ nigræ, pedes nigri, tarsi fusi, alæ subfuscæ.

Corpus angustum, convexum, atrum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace vix latius ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, subclavatae, graciles, thorace non longiores ; articulus 1^{us} longus, linearis ; 2^{us} longicyathiformis ; 3^{us} et 4^{us} minimi ; 5^{us} et sequentes breves, usque ad 10^{um} curtantes ; clava longiconica, acuminata, articulo 10° plus duplo longior : thorax ovatus : prothorax transversus, brevissimus : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ non bene determinatae ; paraptera et epimera magna ; scutellum subconicum : metathorax brevis, declivis, postice angustus : petiolus brevissimus : abdomen fusiforme, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius : pedes nigri, simplices, subæquales ; trochanteres picei ; genua picea ; tarsi fusi, apice picei : alæ subfuscæ ; squamulæ piceæ ; nervi fusi ; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari non brevior, cubitali multo longior ; stigma parvum. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 $\frac{1}{2}$.)

Entedon Ufens, Fem. Viride, abdomen nigro-purpureum, antennæ nigræ, pedes fulvi fusco-cincti, femora viridia, alæ sublimpidæ.

Corpus sublineare, convexum, viride, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi rufi, mediocres, non extantes : antennæ nigræ : thorax ovatus : prothorax transversus, brevis : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatae, postice approximatæ ; scutellum subconicum : metathorax mediocris, obconicus, declivis : petiolus brevis : abdomen brevi-ovatum, læve, supra depresso, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo brevius ; discus nigro-purpureus ; segmentum 1^{um} sat magnum ; 2^{um} et sequentia breviora, subæqualia : pedes fulvi, simplices, subæquales ; coxae virides ; femora viridia ; tarsi apice fusi ; mesopедум et metapедум tibiæ apice fuscæ : alæ sublimpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fulvi ; nervus ulnarum humerali longior, radialis ulnari brevior, cubitalis brevissimus ; stigma minutum. (Corp. long. lin. $\frac{3}{4}$; alar. lin. 1 $\frac{1}{4}$.)

Closterocerus Pelor, Mas. Viridis, abdomen purpureum, antennæ nigrae, pedes fluvo-fulvi, femora nigra, alæ sublimpidæ.

Corpus angustum, sublineare, convexum, viride, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, brevissimum, impressum, thorace paullo latius ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ nigræ, subfiliformes, hirtæ, graciles, thorace non longiores ; clava fusiformis, acuminata, articulo praecedente plus duplo longior : thorax ovatus : prothorax brevissimus, supra vix conspicuus : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatae, postice approximatæ ; scutellum subconicum : metathorax mediocris, declivis, obconicus : petiolus brevissimus : abdomen sublineare, depresso, lœve, purpureum, basi viride, thorace paullo brevius et angustius : pedes fulvi, graciles, subæquales ; coxae nigræ ; femora nigra, apice fulva ; tarsi flavi, apice fusi : alæ sublimpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fulvi ; nervus ulnaris humerali duplo longior, radialis vix ullus, cubitalis brevissimus in alæ discum abrupte declivis ; stigma minutum. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$; alar. lin. 1.)

XXXI.—Descriptions of Chalcidites discovered in Coquimbo by C. Darwin, Esq. By FRANCIS WALKER, Esq., F.L.S.

Lamprotatus Tubero, Fem. Ater, abdomen nigro-purpureum, antennæ fuscæ, pedes fulvi, femora picea, alæ limpidæ.

Corpus breve, robustum, convexum, atrum, nitens, scitissime squamcum, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace latius ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : oculi picei, mediocres, non extantes : antennæ fuscæ, extrosum crassiores, thorace non longiores ; articulus 1^{us} niger, longus, gracilis ; 2^{us} piceus, longicyathiformis ; 3^{us} et 4^{us} minimi ; 5^{us} et sequentes usque ad 10^{us} breves, approximati ; clava conica, acuminata, articulo 10° duplo longior : thorax ovatus : prothorax transversus, mediocris, antice angustus : mesothoracis scutum longitudine multo latius ; parapsidum suturæ sat bene determinatae ; scutellum subconicum ; paraptera et epimera magna : metathorax magnus, obconicus, declivis : petiolus sat longus : abdomen subrhombiforme, lœve, nigro-purpureum, supra planum, subtus carginatum, thoracis dimidio vix longius : pedes fulvi, simplices, subæquales ; coxae nigræ ; femora picea, apice basique fulva ; tarsi apice fusi : alæ limpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fulvi ; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari vix brevior, cubitali multo longior ; stigma minutum. (Corp. long. lin. 1 $\frac{1}{4}$; alar. lin. 2 $\frac{1}{2}$.)

Var. β. Antennis articulus 1^{us} viridis : abdomen æneum : femora nigra ; tibiæ piceæ.

Lamprotatus? Nævolus, Mas? Viridis, antennæ piceæ, pedes piceo-virides, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Corpus angustum, convexum, viride, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput transversum, breve, thorace latius ; vertex latus ; frons impressa, abrupte declivis : antennæ subfiliformes, graciles, piceæ, thorace paullo longiores ; articulus 1^{us} longus, linearis, nigro-viridis ; 2^{us} longicyathiformis ; 3^{us} et 4^{us} minimi ; 5^{us} et sequentes usque ad 10^{us} breves, approximati ; clava longiconica, acuminata, articulo 10° plus duplo longior : thorax ovatus : prothorax transversus, mediocris, antice angustus : mesothoracis scutum longitudine latius ; parapsidum suturæ bene determinatae, postice approximatæ ; scutellum subconicum : metathorax mediocris, obconicus, declivis : abdomen ademptum : pedes virides, graciles, subæquales ; trochanteres picei ; genua flava ; tibiæ piceo-virides ; tarsi flavi, apice fusi : alæ limpidæ ; squamulæ piceæ ; nervi fusi ; nervus humeralis ulnari multo